

Beställare (Avsändare)		Patient-ID	
Betalar			
Svarsmottagare	Telefon nr.:	Provtagningsdatum:	
Vidimeringskod Tc	Diagnos/särskilda upplysningar		
KÄND ANTIKROPP.....	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	VILKEN? _____
TIDIGARE BLODTRANSFUSION.....	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	NÄR? _____
TRANSFUSIONSREAKTION.....	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	VILKEN? _____
TIDIGARE GRAVIDITET.....	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	SENASTE (ÅR) _____
PÅGÅENDE GRAVIDITET.....	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	BERÄKNAD FÖRLOSSNING _____
SENASTE Rh PROFYLAX.....	DATUM: _____		

BLODGRUPPERING Etc.

IDENTITETSKONTROLL enl SOSFS 2009:29

AKUT Svar önskas senast datum, klockslag _____

BLODGRUPPERING (inkl. antikroppsscreening)

DAT

Fetalt RHD

UTREDNING _____

Kommentarer

BESTÄLLNING

IDENTITETSKONTROLL enl SOSFS 2009:29

AKUT BAS-test Svar inom 1 timme

BAS-test Svar inom 4 timmar

BK(S)-test

ANTAL

ERYTROCYTER _____ BESTRÅLADE

TROMBOCYTER _____

PLASMA _____

OPERATIONSdatum/TID _____

TRANSFUSIONSdatum/TID _____

Akutgruppering ifylles av Blodcentralen

Anti-A	Anti-B	Anti-D	Anti-D	Ctl	DAT

LabNummer

PRELIMINÄRSVAR

RhD

Datum/Signatur

IDENTITETSKONTROLL

(Enl. Socialstyrelsens bestämmelser)

Innan blodprovstagningen påbörjas, skall provtagningsrören vara märkta med patientens namn och personnummer eller om det sistnämnda ej är känt, med unikt reservnummer från TakeCare. För nyfödda barn anges efternamn, kön, födelsedatum, identitetsnummer enligt identitetsband samt moderns namn och personnummer.

Etikettering får icke ske efter provtagningen. Lossnar etiketten från provtagningsröret sedan proven tagits, skall provet kasseras.

I direkt samband med provtagningen kontrolleras att provtagningsrörets etikett och remissen innehåller korrekta identitetsuppgifter, antingen genom att patienten ombeds att själv uppge sitt personnummer (eventuellt endast födelsedatum) och namn, eller genom att dessa uppgifter hämtas från ett på patienten anbringat identitetsband.

Ovanstående identitetskontroll skall göras även om patienten är känd för provtagaren.

Den som tar provet skall med fullständig namnteckning, ej signatur, intyga att nämnd kontroll har skett. OBS! Ej blyerts, kulspetspenna med blått bläck skall användas!

ANVISNINGAR

För blodcentralen speciellt viktiga diagnoser är anemier, blodsjukdomar i retikuloendoteliala och lymfatiska system samt graviditeter.

Uppgifter om tidigare transfusioner, framför allt inom de senaste fyra månaderna, är nödvändiga för bedömning av blodgrupp.

Rör och remiss ska komma samtidigt till blodcentralen

PROVTAGNING

Provtagning för blodgruppering och förenlighetsprovning bör av säkerhetsskäl ske vid skilda tillfällen. Undantag medges i medicinska akuta situationer SOSFS 2009:29

BLODGRUPPERING inkl. DAT (Direkt antiglobulintest)	4,5 mL blod i EDTA-rör
Nyfödda	4,5 mL navelsträngsblod i EDTA-rör 2-3 kapillärrör
ANTIKROPPSUTREDNING	3 st 4,5mL blod i EDTA-rör (ej Barcode)
BAS-test	4,5 mL blod i EDTA-rör Alt. Kapillärt 2-3 rör
MG-test	4,5 mL blod i EDTA-rör
Fetalt RhD	7 mL blod i EDTA-rör